

PASIENTINFORMASJON - FUMADERM

Fumaderm er et medikament som er utviklet av Fumarate, som finnes i planten *Fumaria officinalis*. Medikamentet brukes til Psoriasis behandling.

HVORDAN VIRKER FUMADERM?

I Psoriasis kan vi se en økt celledeling og opphopning av inflammatoriske celler i huden. Vårt immunforsvar er involvert i denne prosessen.

Fumaderm virker anti-inflammatorisk dvs reduserer inflammasjonen, hemmer den hyppige celledelingen og påvirker immunforsvarets celler.

HVORDAN BRUKES FUMADERM?

Tablettene tas hver dag.

Doseringen varierer litt ut i fra din vekt og sykdomsaktivitet.

Din lege vil informere deg om hvor mange tabletter du skal ta.

HAR FUMADERM BIVIRKNINGER?

Vanlige bivirkninger er:

***Urolig mage.** Dette kan variere fra luftplager til løs avføring. Noen kan oppleve kvalme og magesmerter i tillegg. Det er oftest verst 4 – 12 uker etter påbegynt behandling.

***Hetetokter.** De er oftest verst i begynnelsen av behandlingen, men avtar etter hvert.

Sjeldne bivirkninger er hodepine og tretthet.

HVEM SKAL IKKE TA FUMADERM?

Pasienter med lever eller nyresykdom. Kjent kreftsykdom eller alvorlig nedsatt immunsystem. Gravide, ammende og barn.

FUMADERM OG ANDRE MEDIKAMENTER?

Informér alltid legen din om at du bruker Fumaderm. Det bør ikke brukes sammen med andre medikamenter mot psoriasis, unntatt lokal behandling.

HVORDAN SKAL BEHANDLINGEN KONTROLLERES?

Det er nødvendig med regelmessige laboratorieundersøkelser i begynnelsen.

Blodprøve og urinprøve tas før behandlingsstart, så 1 gang/mnd de første 6 månedene.

Deretter 1 gang annenhver måned.

Skjema Fumaderm dosering.

Uke	Fumaderm initialt	Fumaderm
1	1 tablett daglig	
2	1 tablett 2 ganger daglig	
3	1 tablett 3 ganger daglig	
4		1 tablett daglig
5		1 tablett 2 ganger daglig
6		1 tablett 3 ganger daglig
Vedlikeholdsdose		Maximum 2 tabletter 3 ganger daglig.