

RISIKOFAKTORER

ALLE nyfødte scores med TVS-N ved 2 timers alder

Pasient-ID (barnets navnelapp)

INGEN RISIKOFAKTORER ☐  Ingen flere skåringer

Risiko for infeksjon

- Vannavgang > 18 t, kun scoring ved 6+12 t ☐
- Mor GBS i urin, ikke adekvat behandlet* ☐
- Korioamnionitt ☐
- Minst 2 unormale verdier i scoringskjema ☐
- OBS! GBS-infeksjon hos tidligere barn innlegges 3D

*Første dose min 4 timer før forløsning.

*Disse barna skal være innlagt minst 48 t

TVS-N også 6-8 + 12 + 24 t alder

Føtal distress/asfyksi/intrapartum

- pH < 7,05 i navlearterie ☐
- BE ≤ -12 mmol/l i navlearterie ☐
- Aktivt ventilert lengre enn 5 min ☐
- Apgar < 7 ved 5 min ☐
- Tykt misfarget fostervann* ☐

*Ved tykt misfarget fostervann og minst 1 kryss ekstra: overflyttes 3D

*Mekoniumaspirasjon og pat. CTG/sectio/lav apgar/intubert/GA > 42 uker skal tilses av lege ved 1 t alder

TVS-N også 1 + 6-8 t alder

Risiko for lavt blodsukker
Følg prosedyre for hypoglykemi

Risiko for lavt blodsukker

- Minst 1 kryss på "føtal distress/asfyksi/intrapartum/tykk" ☐
- Maternell diabetes (se prosedyre) ☐
- Maternell bruk av beta-blokker i sv.skap ☐
- FV > 4500 g ☐
- SGA (se tabell) ☐
- Født før uke 36 ☐

Følg prosedyre for hypoglykemi

Rhesus-immunisering ☐

Obs gulsott og anemi

Mistanke om syndrom ☐

Varsle barnelege

Vakuumforløsning
obs. subgalealt hematom/økende hevelse ☐

Sjekk hode rett etter fødsel + 2 t

Barn som skal ha legetilsyn/konf med barnelege UMIDDELBAR

Synlig gulsott / over behandlingsgrense < 24 timers alder

Gallefarget oppkast

Apnøer

Mistanke om kramper

Annet nyfødt barn man oppfatter som sykt

Se prosedyre ID 47725, Overflytning av nyfødte fra Fode/barsel

SGA-tabell

36 uker	< 2,5 kg
37 uker	< 2,6 kg
38-39 uker	< 2,7 kg
40 uker	< 2,8 kg
41-42 uker	< 2,9 kg

SKÅRINGSSKJEMA TVS-N - Tidlig varslingskår-nyfødte

Handling		Fortsette observasjoner som planlagt		Pasient-ID (barnets navn/lepp)	
Hvit obs					
1 gul obs.		Varsle jordmor og revurder om 30 minutter			
2 gule / 1 rød		Umiddelbart varsle vakthavende barnelege og ansvarlig			
2 røde / 1 rød på nevrologi		Umiddelbart tilkalle vakthavende barnelege og varsle ansvarlig jordmor			
Født dato: kl:		Fødselsmetode:			
GA: Appar (1-5-10 min):		Lengde Vekt HO			
Skriv når barnet skal observeres f.eks. "full skår 2, 6-8, 12 og 24 timer" eller "kun blodsukker ihht prosedyre":					
		Første 4 levetimer		4 - 24 levetimer	
Sign. jordmor/barnepleier					
Dato					
Klokkeslett					
R E S P I R A S J O N	Respirasjons- frekvens (telles i 1 minutt)	80			
		70			
		60			
		50			
		40			
		30			
Pressing	Ja Nei				
Postduktal SpO ₂ (fot)	≤ 89 %				
	90-94 %				
	≥ 95 %				
S I R K U L A S J O N	Puls i hvile	180			
		170			
		160			
		150			
		140			
		130			
		120			
		110			
		100			
		90			
Spising (ikke første 4 levetimer)	Ikke Dårlig Bra				
A T F E R D	Svært hypoton/uvekkbar/kramper Hypoton/sittrer/irritabel Normal tonus og atferd				
	Temperatur* ny scoring 30 minutter etter tiltak	38			
		37			
		36			
	Bekymring (foreldre/personale)	Ja Nei			
	Blodsukker (kun på indikasjon, se prosedyre for hypoglykemi)	≥ 2,6			
		2,0-2,5			
1,5-1,9					
1,1-1,4					
	≤ 1,0				

Skriv inn tallverdien på observasjonene i aktuell kolonne. På pressing, spising, atferd og bekymring marker med X i aktuell kolonne.

TVS-N, nasjonal utgave, oppdatert 6.6.2023